

Barn och läkemedel

kemedlen faktiskt har det. Dessutom är en studie av Cipramil på gång att slutföras, en studie i vilken Anne-Liis von Knorring själv har varit koordinator. Studien är ännu inte publicerad.

– De enda biverkningar vi har kunnat se med Cipramil i dessa patientgrupper är en ökad frekvens av trötthet. Den ökade frekvens av självmordstankar, som vissa andra typer av läkemedel haft som biverkningar, har inte vi kunnat se i vår studie. I studien ingår 240 patienter i åldern 13–18 år, och vår studie är eventuellt för liten för att resultaten ska vara helt tillförlitliga, den kanske måste utökas ytterligare.

Överdrivet som »larmrapport«

EUs läkemedelsnämnd, CPMP, ska bland annat försöka utröna om, och i så fall varför, vuxna med depression reagerar på ett annat sätt än barn och ungdomar på SSRI-läkemedel. Anne-Liis von Knorring menar att SSRI-preparat kan

ha de biverkningar som rapporterats specifikt hos barn och ungdomar. De är ofta mer impulsiva och har ett kortare perspektiv på tillvaron än vuxna, vilket skulle kunna förklara en del av varför frekvens av självmordstankar som upptäckts hos barn och ungdomar är högre än vid behandling av vuxna.

– Men problematiken är betydligt mer komplex än så. Den här sortens biverkningar ingår ofta vid behandling av depressioner genom att behandlingen leder till att patienten får ork att ta sig för saker som depressionen tidigare förhindrade. Såsom att skada sig själv.

– Principen är att den första behandlingstiden, framför allt de första fyra veckorna, är den mest kritiska i det avseendet. Det finns också en ökad risk då läkemedlen sätts ut, säger Anne-Liis von Knorring.

Som »larmrapporter« anser hon att de rapporterade riskerna är överdrivna men att det ändå finns all anledning att vara försiktig då SSRI-preparat förskrivs till barn och ungdomar.

– Det är mycket viktigt att det är specialister i psykiatri eller speciellt kunniga pediatriker som ansvarar för förskrivningen av dessa läkemedel till barn och ungdomar. Redan 1995–1996 rekommenderade Läkemedelsverket att dessa läkemedel inte skulle förskrivas av allmänläkare utan att en specialist först rådfrågades, och idag tror jag i stort sett att inget barn under tonåren får sådana



FOTO: HANS PETERSSON

Som »larmrapporter« anser Anne-Liis von Knorring att de beskrivna riskerna för biverkningar hos barn som fått SSRI-preparat är överdrivna.

läkemedel förskrivna annat än av specialistutbildade läkare, säger hon.

– Samtidigt blir det allt vanligare att barn kommer just till allmänläkare tillsammans med sina föräldrar på grund av trötthet och värk, vilket kan vara tecken på depression. Inte minst därför är det viktigt att mer av människan under utveckling läggs in i den grundläggande utbildningen av läkare.

Peter Örn

Ungdomar mår allt sämre

Antalet fullbordade självmord bland vuxna individer minskade med 20 procent under 1990-talet och är nu nere på 1 600 självmord per år. En trolig förklaring är allt effektivare läkemedel mot depressioner, de så kallade SSRI-preparaten. Men bland ungdomar minskar inte antalet självmord. 50 ungdomar mellan 15 och 19 år tar livet av sig varje år. I åldersgruppen 15–24 år är motsvarande siffra 150 dödsfall. Ungdomar mår dessutom allt sämre psykiskt. Från 1988/1989 fram till 2000/2001 har andelen unga män med svåra besvär av ångslan, oro och ångest fördubblats och blivit två och en halv gång så stor bland unga kvinnor. Det visar siffror från Statens folkhälsoinstitut.

SSRI-preparat är inte godkända för behandling av barn och ungdomar med depression. Det har, till skillnad från behandling av svåra tvångssyndrom hos barn och ungdomar, fram till nyligen saknats kliniska studier som kunnat visa på positiva effekter mot depression i den patientgruppen. Dessutom har det visat sig att vissa av dessa läkemedel kan ge en ökad risk för psykiska biverkningar i form av emotionell labilitet hos barn och ungdomar. Läkemedelsverket har pekat ut Seroxat och Efexor som två läkemedel förskrivare bör vara extra försiktiga med. •

Läkemedelsverket inväntar EU-rekommendationer om SSRI

■ Engelska läkare rekommenderas att inte påbörja nya behandlingar med vissa SSRI-preparat till patienter under 18 år som har en depression. Läkemedelsverket i Sverige väljer dock att invänta rekommendationer från den europeiska läkemedelsnämnden CPMP innan det kan bli aktuellt att följa Englands exempel.

– Vi har löpande gått ut med information om att förskrivare bör vara extra vaksamma vid förskrivning av vissa SSRI-preparat till barn och ungdomar med depression. Enligt den information som jag har fått är det främst specialister inom barn- och ungdomspsykiatri som förskriver dessa läkemedel, och vi bedömer att den information vi gått ut med tills vidare räcker, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, som är chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Det engelska beslutet kom efter det att man tagit del av resultat som visat att

paroxetin inte har någon klinisk effekt hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år. Tvärtom kan behandlingen leda till ökad risk för självmordsrelaterade biverkningar. Motsvarande resultat har sedan visats i studier med venlafaxin, ett annat SSRI-preparat.

Den europeiska läkemedelsnämnden har en lista med frågor till tillverkarna av de aktuella SSRI-preparaten som nämnden vill ha svar på för att kunna utvärdera nyttan och riskerna. Även det svenska Läkemedelsverket deltar i den här processen.

– Ännu har vi inte fått några svar på våra frågor till tillverkarna. Men i januari ska CPMP arrangera ett expertmöte i London för att behandla det här ärendet, och efter det tror jag vi kan komma fram till rekommendationer, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Peter Örn