

Erinran för AT-läkare upphävs

En AT-läkare tilldelades förra hösten en erinran från HSAN sedan hon satt in ibuprofen till en warfarinbehandlad patient.

Nu har förvaltningsrätten upphävt disciplinpåföljden trots att man anser att patienten blev felbehandlad. (Mål nr 16145-10)

Läkartidningen refererade i höstas fallet med en 93-årig man som handlades av en AT-läkare på akutmottagningen sedan han sökt för svår smärta i nacken (LT 44/2009, sidan 2858). Patienten behandlades med warfarin. Smärtan bedömdes efter utredning som en oklar nackspärr, och efter att ha konsulterat bakjouren satte AT-läkaren in kodeinparacetamol och ibuprofen. Patienten skrevs ut.

Efter några dagar började han kräkas och fick diarré, dessutom uppstod, enligt anmälan till HSAN, spontanblödningar på armar och rygg. INR låg på 6,0. I kommunikationen med Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skrev AT-läkaren att hon och bakjouren var väl medvetna om riskerna med behandlingen men påpekar också att det fanns ett INR-prov inplanerat redan om fyra dagar.

Trots att AT-läkaren förstas var under utbildning och trots att hon konsulterat sin bakjour valde HSAN att tilldela henne en erinran. HSAN anser att även om ordinationen var förankrad hos bakjouren är det AT-läkaren själv som ansvarar för hur hon fullgör sina arbetsuppgifter.

AT-läkaren överklagade till förvalt-

ningsrätten i Stockholm och fick stöd av Socialstyrelsen, som visserligen anser att patienten inte fått omsorgsfull och sakkunnig vård, men menar att AT-läkaren inte kan ha felbehandlat patienten av oaktsamhet eftersom hon följt bakjourens anvisningar.

AT-läkaren själv påpekar i sitt yrkande att alternativet att ge opioider skulle varit ännu mer riskabelt. Alternativet att i så fall lägga in patienten för övervakning var uteslutet på grund av platsbrist.

Förvaltningsrätten delar Socialstyrelsens uppfattning att det, trots felbehandling, saknas möjlighet att tilldela disciplinpåföljd för en läkare under utbildning som följt bakjourens anvisningar.

Sara Gunnarsson

Rektala besvär kräver rektal undersökning

En patient i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral för ändtarmsbesvär. Patienten själv antog att han hade hemorrojder och uppgav också att han var hård i magen. Han hade inte haft några blödningar. Läkaren A, specialist i allmänmedicin, skrev utifrån de uppgifterna ut rektalsalva med lidokain och hydrokortison samt tarmreglerande medel.

Efter återbesök hos en annan läkare på vårdcentralen remitteras han vidare, och då upptäckts en rektaltumör.

Patienten har anmält läkare A till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för fel i vården. Han anser att det var fel att hon inte ens tittade på hans hemorrojder, än mindre undersökte dem.

HSAN anser också att läkaren borde undersökt patienten rektalt för att själv kunna ta ställning till besvären och utesluta allvarlig sjukdom.

HSAN bedömer att bristerna i handläggningen skett av oaktsamhet, och läkaren får en varning. (HSAN 4611)



Foto: SPL

Ett diskbräck opererades utan efterföljande förbättring.

Opererade diskbräck på fel nivå

En 44-årig kvinna genomgick en diskbräckoperation utan efterföljande förbättring. En månad efter operationen skrevs därför remiss till MR-undersökning som utfördes ytterligare cirka en månad senare. Det visade sig då att ortopedan opererat på fel nivå. Så småningom gjordes en omoperation. Patienten har anmält ortopedan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Ortopeden själv beklagar i sitt yttrande till HSAN det inträffade. Han skriver att han normalt, förutom genom lysningskontroll, brukar göra ytterligare en kontroll med sidoprojektion före diskektomi. I det aktuella fallet gjordes dock ingen diskektomi. Då patienten blödde relativt ymnigt från epiduralkärlen dekomprimerades nervroten och man blodstillade.

HSAN skriver i sitt beslut att ortopedan genomfört en diskbräckoperation på fel nivå, att han när detta upptäcktes inte har dokumenterat det i journalen och att det av journalen inte heller framgår om han har kontaktat patienten med anledning av den felaktiga operationen. Det tolkar HSAN som att ortopedan inte vidtagit adekvata åtgärder för att rätta till misstaget. Ortopeden får en varning. (HSAN 1904/09)