

Inte tillräckligt förlita sig enbart på skrivna journaler

Symtomen och en noggrann anamnes borde lett till misstanke om lungemboli

Det är knappast tillräckligt att enbart förlita sig på skrivna journaler. Kirurgen borde ha bildat sig en egen uppfattning av patientens besvär, något som borde ha fått honom att överväga lungemboli. (HSAN 49/07)

Den 67-årige mannen hade den 3 oktober 2006 fått en höftprotes inopererad. Han insjuknade akut i början av december med smärta på vänster sida vid andning. Han sökte akut vid primärvårdens jourverksamhet den 6 december.

En AT-läkare fann att han var öm invid höger revbensbåge med smärta upp mot höger axel samt lätt förhöjd kroppstemperatur och röda blodkroppar i urinen. På misstanke om kirurgisk sjukdom remitterades han därefter akut till kirurgiska kliniken vid ett universitetssjukhus.

Lungembolier konstaterades

En lungröntgenundersökning dagen efter var normal, men visade enligt röntgensvaret vätska i vänster lungsäck. Han bedömdes därefter av kirurgen, som konstaterade att patienten hade en förhöjd snabbsänka men i övrigt var opåverkad. Kirurgen skickade hem honom under diagnosen buksmärta.

Under de närmaste dagarna blev patienten sämre och den 15 december konstaterades att han hade lungembolier.

Patienten anmälde AT-läkaren och kirurgen, som bestred att de gjort fel. AT-läkaren frias, så vi lämnar hennes argument.

Kirurgen berättade att patienten kom till akutmottagningen kl 01.47 och undersöktes av den jourhavande kirurgen, som bedömde att han kunde lida av en

lätt kolecystit alternativt pleuropneumoni och lades in för observation.

Kirurgen själv träffade patienten på morgonen på intagningsavdelningen i samband med rondan, då var patienten helt smärtfri. Uppgifter saknades om att patienten genomgått en höftledsoperation den 3 oktober.

Ultraljud av gallblåsa och gallgångar visade inget patologiskt, ingen hydro-nefros av höger njure kunde ses. Lung-röntgen visade enligt preliminärt svar »Lätt avrundad pleurasinus ... som vid minimal vätska alternativt pleuritrest«. Laboratoriemässigt var blodstatus utan anmärkning förutom en lätt leukocytos.

Amylas, kreatinin och leverprov var normala, men CRP var förhöjt till 73. Med anledning av att patientens anamnes och status hade gett misstanke om bukåkomma, men att han vid undersökning av kirurgen var helt besvärsfri samt att det i journalanteckningarna inte framkom att patienten var opererad drygt två månader tidigare, fanns det inga skäl att driva diagnostiken längre. Inte heller att remittera patienten till medicinklinik för akut bedömning, hävdade kirurgen.

Viktigt differentialdiagnos

Ansvarsnämnden konstaterar att patienten insjuknat med typiska symtom på retning av lungsäcken, som borde ha ingett misstanke om lunginflammation eller lungemboli.

Inte minst med tanke på att han relativt nyligen hade genomgått en större or-

topedisk operation borde lungemboli ha varit en viktig differentialdiagnos.

AT-läkarens anamnesupptagning och undersökning måste kritiseras. Hon har inte noterat att patienten nyligen hade genomgått en större ortopedisk operation och oroat sig för lungemboli, och i journalen saknas helt uppgift om hjärtstatus trots att ankomstledningen anges som buk- och bröstsmärta.

Ringa erfarenhet ursäktar bristerna

Men hon har konsulterat en medicinläkare, som gett henne rådet att remittera

patienten till kirurgisk klinik för bedömning. Hon får i och med detta anses ha gjort vad som ankommit på henne och bristerna i handläggningen i övrigt får med hänsyn till hennes ringa erfarenhet anses som ursäktliga. Hon frias.

Kirurgen har försvarat sin handläggning med att det inte framgick av journalen att patienten nyligen

hade genomgått en större ortopedisk operation. Det är dock knappast tillräckligt att enbart förlita sig på skrivna journaler utan han borde ha bildat sig en egen uppfattning av patientens besvär.

Symtomen var tydliga och en noggrann anamnes tillsammans med fyndet av vätska i lungsäcken och de förhöjda värdena av vita blodkroppar och CRP borde ha fått honom att överväga lungemboli som differentialdiagnos och ordna en utredning.

I stället missade han en diagnos som obehandlad kan leda till snabb död. Han får en erinran. ■

»Det är dock knappast tillräckligt att enbart förlita sig på skrivna journaler utan han borde ha bildat sig en egen uppfattning av patientens besvär.«

Ung kvinna fick de inre blygdläpparna bortopererade och klitoris blottlagd

En plastikkirurg varnas sedan han opererat bort de inre blygdläpparna och till hälften blottlagt klitoris på en ung kvinna, som enbart ville ha blygdläpparna förminskade. (HSAN 3371/06)

Den 20-åriga kvinnan sökte hos plastikkirurgen på grund av att hon upplevde besvär av sina inre blygdläppar och ville få dem förminskade.

Ingrepp gjordes den 12 juni 2006. Ef-

teråt hade patienten avsevärda lokala besvär. Den 12 september undersöktes hon på plastikkirurgiska mottagningen vid ett universitetssjukhus. Det konstaterades att hennes inre blygdläppar sak-

nades helt och att klitoris var till hälften blottlagd.

Patienten anmälde plastikkirurgen för felaktig behandling i strid mot vad de muntligt kommit överens om.

»Behandlat enligt avtal«

Ansvarsnämnden läste patientens journaler samt hämtade in yttrande av plastikkirurgen, som bestred att han gjort fel.

Han hänvisade till att patienten hade behandlats enligt ett preoperativt avtal mellan dem. Han hänvisade till journalen samt bilder tagna före och efter ingreppet.

Operationen gjordes enligt beprövad teknik, utan skada på vävnaden omkring klitoris eller urinrötet.

Han opererade patientens labia minora, som var missbildade, och exciderade enbart labia minora med en därtill specialutvecklade kniv, Elman (radiofrekvenser). Tekniken gör excision av vävnad motsvarande genitalia så precis som möjligt.

Postoperativt fann han att klitoris och slemhinnan är bevarade. Operationen har inte medfört att klitoris är helt blottlagd och det finns inget samband med stympad/skadad klitoris.

Kan bli mer radikalt än man tänkt sig

Professor emeritus Marc Bygdeman har på Ansvarsnämndens begäran lämnat ett utlåtande.

Han konstaterade att patientens kritik innebar att i stället för att ta bort »häng-et« av de inre blygdläpparna har hela blygdläpparna tagits bort och klitoris blottlagts.

Att reducera blygdläpparna är ett känsligt ingrepp, dels därför att de är en viktig erogen zon, dels därför att man får en postoperativ reduktion av kvarvarande del av blygdläpparna så att slutresultatet kan bli mer radikalt än man tänkt sig.

Någon anledning att förlänga excisionen fram till klitoris finns inte.

Av den skriftliga information patienten fått före operationen framgår också att klitorisområdet ligger helt utanför det kirurgiska ingreppet.

Man bör alltid vara restriktiv med att utföra en blygdläppsreduktion, men här har patientens önskan att få ingreppet utfört varit stark, varför man inte kan kritisera att plastikkirurgen utförde det.

En god princip är att göra resektionen

mindre omfattande eftersom det vid ingreppet kan vara svårt att bedöma slutresultatet.

Plastikkirurgen måste kritiseras för att inte ha iakttagit denna försiktighet.

Allvarligaste kritiken

Den allvarligaste kritiken är dock att enligt utlåtandet från plastikkirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset hud ovanför klitoris också exciderats, vilket definitivt inte ingår i ingreppet, hävdade Marc Bygdeman.

»Den allvarligaste kritiken är dock att enligt utlåtandet från plastikkirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset hud ovanför klitoris också exciderats, vilket definitivt inte ingår i ingreppet.«

Patienten påpekade i ett nytt yttrande att plastikkirurgen i en anteckning den 8 augusti har uppgett att han inte exciderat slemhinnan intill klitoris utan enbart gjort minskningen av labia minora.

Halva klitoris var helt blottlagd efter ingreppet och hon har ärr av stygn ovanför klitoris. Det var inte överenskommet att klitoris skulle blottläggas.

Plastikkirurgen har avslutningsvis påpekat att han, sedan han läst igenom rapporter gällande det här fallet, har noterat att man har funnit en helt normal läkning.

Patienten hade preoperativt en missbildning som inte framhävts av någon som har bedömt de preoperativa foton.

Klitoris är, när labia majora dras isär, enbart täckt till 50 procent av det som är kvar från labia minora, då en mindre resektion fram på båda sidor av klitoris var nödvändig eftersom patienten hade en missbildning av labia minora.

Excisionen av labia minora har inte medfört att patienten skaver klitoris, utan denna är fortfarande skyddad av labia majora, hävdade plastikkirurgen.

Borde inte ha utförts

Ansvarsnämnden instämmer i Marc Bygdemans bedömning att det inte finns stöd för att kritisera plastikkirurgen för att han på patientens begäran opererade henne med den överenskomna reduktionen av de inre blygdläpparna.

Det framgår emellertid att han vid ingreppet inte enbart reducerat blygdläpparna utan även förlängt reduktionen till att omfatta huden ovanför klitoris. Detta var inte överenskommet och borde därför inte ha utförts.

Plastikkirurgen har dessutom vid reduktionen av de inre blygdläpparna avlägsnat för mycket av dessa, vilket gett ett icke önskvärt slutresultat.

För sina fel får han en varning, beslutar Ansvarsnämnden. ■

»Ful ovana« att dricka mycket berodde på diabetes insipidus

Att patienten jämt var törstig och drack mycket betecknades av distriktsläkaren som »en ful ovana«. Men patienten hade diabetes insipidus. (HSAN 3269/06)

Den 41-åriga kvinnan hade under en tid haft kontakt med vårdcentralen. Man tog prov för att utreda om hon drabbats av någon sköldkörtelsjukdom och distriktsläkaren informerade per telefon om vad analysen visat. I journalen antecknade hon att »pat är obstinat och inte alls nöjd med det svaret« och att hon »jämt är törstig och dricker mkt, vilket väl lär vara en ful ovana«.

Patienten anmälde distriktsläkaren, som hade avfärdat att besvären hade fysiska orsaker och påstod att den svåra törst hon besvärades av orsakades av att hon sov med öppen mun. Eftersom hon dessutom var mycket matt samt besvärades av svettningar och hjärtklappning, hade man tidigare misstänkt att besvären härrörde från sköldkörteln. Distriktsläkaren ansåg sig, per telefon, kunna bedöma att besvären i stället härrörde från tjocktarmen.

Ansvarsnämnden läste patientens journal. Läkaren valde att inte yttra sig.

Patienten berättade att hon senare på en medicinklinik fått diagnosen diabetes insipidus. Hennes besvär har avklingat med medicinering.

Andra orsaker måste uteslutas

Ansvarsnämnden konstaterar att patienten led av hjärtklappning och svettningar, hade magrat 4 kg samt var törstig, vilket medfört att hon druckit upp mot 6 liter vatten per dygn. Distriktsläkaren uppgav vid telefonkontakt med patienten att analyssvaren var normala.

När patienten framhärade i att hon led av en oförklarlig törst, uppgav distriktsläkaren att hennes behov att dricka stora mängder närmast var en ful ovana.

Det förekommer att patienter dricker stora mängder vätska utan att ha ett behov av intag av vatten i den omfattningen (psykogen polydipsi och polyuri). Innan en sådan förklaring tillgrips måste dock andra orsaker till ökad törst och stora urinmängder uteslutas.

Provtagning hade visat att patienten inte hade diabetes mellitus. Det återstod att undersöka om hon led av diabetes insipidus. Distriktsläkaren borde ha remitterat henne till en sjukhusmottagning för utredning. Hon får en erinran. ■